

Interakce s léky a léčivými přípravky

Kombinovat alkohol a léky může být nebezpečné.

Kombinování alkoholu s léky nebo léčivými přípravky může být nebezpečné – ať již se jedná o volně prodávané léky nebo léky na předpis. Zvláště opatrní by měli být starší lidé, neboť u nich je pravděpodobnost užívání léků vyšší a jejich celkový zdravotní stav je celkově oslabený.

Existuje řada léčivých přípravků, které by se s alkoholem nikdy neměly míchat. U dalších přípravků je třeba se mít na pozoru.

Existuje řada léků, které by nikdy neměly být kombinovány s alkoholem.

Co se může stát?

- Léky by mohly mít vyšší účinek než je pro organismus bezpečné. Alkohol může zvyšovat účinky sedativ a léků navozujících spánek. To může vést k intenzivnějším projevům ospalosti, hlubokému bezvědomí, nebo dokonce smrti.
- Může dojít ke zhoršení vedlejších účinků léčiv. Například při kombinaci alkoholu s aspirinem hrozí vyšší riziko vzniku žaludečních vředů.
- Může dojít ke snížení účinnosti léčivého přípravku. Například při kombinaci alkoholu s léky pro diabetiky se může účinek těchto léků snížit, což může vyvolat nebezpečné kolísání hladiny cukru v krvi. Alkohol může dále působit proti účinkům antiretrovirálních léků užívaných při léčbě onemocnění HIV/AIDS.



Podnikněte kroky

Vždy si přečtěte příbalové letáky k lékům které užíváte. Některé léčivé přípravky se s alkoholickými nápoji nesmí míchat vůbec, u dalších přípravků je třeba mít se na pozoru. Vždy se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, zda smíte v době užívání léku pít alkoholické nápoje.

Nic není černobílé. Pamatujte si, že různí lidé různě reagují na léky, alkohol, i jejich vzájemné působení.